

Tabla 1. Características epidemiológicas de las mujeres que recibieron atención del parto en el sistema público de salud, según SIP 2017

Factor de exposición	χ^2	p	Total general	Prematuro	De término
			44 891	n= 4 252	n= 40 639
Grupo etario					
Adolescente	3.8	0.05	9 300 (20.7%)	930 (21.9%)	8 370 (20.6%)
Adulta			35 591 (79.3%)	3 322 (78.1%)	32 269 (79.4%)
Edad para embarazo					
<19 y >35 años	27.5	<0.01	12 145 (27.1%)	1 295 (30.5%)	10 850 (26.7%)
19 a 35 años			32 746 (72.9%)	2 957 (69.5%)	29 789 (73.3%)
Escolaridad					
Primaria o menor	0	0.98	20 963 (46.7%)	1 985 (46.7%)	18 978 (46.7%)
Secundaria o mayor			23 928 (53.3%)	2 267 (53.3%)	21 661 (53.3%)
Estado civil					
Soltera	43.1	<0.01	5 182 (11.5%)	621 (14.6%)	4 561 (11.2%)
Pareja estable			39 709 (88.5%)	3 631 (85.4%)	36 078 (88.8%)
Gravidez					
Primigesta	10.5	<0.01	32 839 (73.2%)	3 021 (71%)	29 818 (73.4%)
Multigesta			12 052 (26.8%)	1 231 (29%)	10 821 (26.6%)
Estado nutricional					
Inadecuado	0.9	0.35	25 428 (56.6%)	2 217 (52.1%)	20 887 (51.4%)
Normal			19 463 (43.4%)	2 035 (47.9%)	19 752 (48.6%)
Control prenatal					
Inadecuado	38.7	<0.01	18 562 (41.3%)	1 568 (36.9%)	16 994 (41.8%)
Adecuado			26 329 (58.7%)	2 684 (63.1%)	23 645 (58.2%)
Embarazo					
Múltiple	758.5	<0.01	265 (0.6%)	156 (3.7%)	109 (0.3%)
Único			44 626 (99.4%)	4096 (96.3%)	40530 (99.7%)
Hipertensión arterial					
Sí	46.1	<0.01	335 (0.7%)	68 (1.6%)	267 (0.7%)
No			44 556 (99.3%)	4 184 (98.4%)	40 372 (99.3%)
Preeclampsia					
Sí	36	<0.01	372 (0.8%)	69 (1.6%)	303 (0.7%)
No			44 519 (99.2%)	4 183 (98.4%)	40 336 (99.3%)

Pasa a la siguiente página...

Viene de la página anterior...

Factor de exposición	X ²	p	Total general	Prematuro	De término
			44 891	n= 4 252	n= 40 639
Eclampsia					
Sí	3.9	0.04	37 (0.1%)	7 (0.2%)	30 (0.1%)
No			44 854 (99.9%)	4 245 (99.8%)	40 609 (99.9%)
Diabetes					
Sí	131.7	<0.01	203 (0.5%)	67 (1.6%)	136 (0.3%)
No			44 688 (99.5%)	4 185 (98.4%)	40 503 (99.7%)
Cardiopatía					
Sí	4.5	0.03	42 (0.1%)	8 (0.2%)	34 (0.1%)
No			44 849 (99.9%)	4 244 (99.8%)	40 605 (99.9%)
Nefropatía					
Sí	2.8	0.09	13 (0.0%)	3 (0.1%)	10 (0.0%)
No			44 878 (100.0%)	4 249 (99.9%)	40 629 (100.0%)
Tuberculosis					
Sí	0.3	0.55	23 (0.1%)	3 (0.1%)	20 (0.0%)
No			44 868 (99.9%)	4 249 (99.9%)	40 619 (100.0%)
VIH					
Sí	0.2	0.66	7 (0.0%)	1 (0.0%)	6 (0.0%)
No			44 884 (100.0%)	4 251 (100.0%)	40 633 (100.0%)
IVU					
Sí	0.2	0.63	3226 (7.2%)	298 (7.0%)	2928 (7.2%)
No			41 665 (92.8%)	3 954 (93.0%)	37 711 (92.8%)
Violencia					
Sí	0	0.99	21 (0.0%)	2 (0.0%)	19 (0.0%)
No			44 870 (100.0%)	4 250 (100.0%)	40 620 (100.0%)

Fuente: Sistema Informático Perinatal, 2017.

en el 63.1% (2684). El 96.3% (4096) correspondieron a embarazos únicos y el 3.7% (156) restante a embarazos múltiples.

Los antecedentes personales de morbilidad se presentaron en el 2.9% (124) de mujeres con parto prematuro. En el 1.6% (68) de las embarazadas se registró el antecedente de hipertensión arterial. El

antecedente de preeclampsia se identificó en 1.6% (69); la eclampsia como antecedente en 0.2% (7). Por otro lado, el 1.6% (67) tenía antecedente de diabetes. La cardiopatía como antecedente se registró en 0.2% (8). El 0.1% (3) tenía antecedente de nefropatía y otro porcentaje igual de de tuberculosis. El VIH se registró en 1 caso.